

PRÁTICA DE CLÍNICA DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES: ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA DE TRASTUZUMAB (HERCEPTIN®) E RITUXIMAB (MABTHERA®)

Alice Monteiro

Enfermeira Chefe, Hospital de Dia,
IPO Porto
alicecmonteiro@gmail.com

Carlos Góis

Enfermeiro Chefe, Hospital de Dia,
IPO Coimbra
carlos.gois.2@gmail.com

Cristina Lacerda

Enfermeira Chefe, Serviço de Oncologia,
IPO Lisboa
cristina_lacerda@hotmail.com

Elisabete Valério

Coordenação Clínica da Mama,
IPO Porto
elisabetesousavalerio@gmail.com

Helena Xavier

Enfermeira Chefe, Hospital de Dia -
Oncologia, Hospital Capuchos
helena.xavier@cblc.min-saude.pt

Ortélia Dias

Enfermeira Chefe, Hospital de Dia -
Oncologia, Hospital Santa Maria
ortelia.dias@cbln.min-saude.pt

Sandra Ponte

Enfermeira Chefe, Hospital de
Dia, Hospital S. Francisco Xavier
smfponte@gmail.com

Sara Torcato Parreira

Enfermeira Especialista, Hospital de
Dia - Oncologia, Hospital Cuf
sara.torcato@gmail.com

RESUMO: As formulações subcutâneas de Trastuzumab (Herceptin®) e Rituximab (MabThera®) têm a vantagem de permitir uma maior comodidade para a pessoa com doença oncológica e maior facilidade na prescrição, preparação e administração. A introdução deste tipo de formulações nos modos de administração de terapêutica antineoplásica exige, por parte dos enfermeiros, uma atualização de conhecimentos, que permita assegurar boas práticas na prestação de cuidados. Com o objetivo de suportar este processo, a Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa desenvolveu dois documentos (“Linhas de Consenso”), com recomendações para os enfermeiros que administram as terapêuticas antineoplásicas Rituximab e Trastuzumab, nas formulações subcutâneas. Um grupo de enfermeiros peritos avaliou a aplicabilidade destes documentos e concluiu que a utilização das “Linhas de Consenso” permite uniformizar procedimentos e orientar as intervenções de enfermagem, o que pode facilitar uma melhoria na educação e acompanhamento da pessoa com doença oncológica.

PALAVRAS-CHAVE: Rituximab; Trastuzumab; Subcutâneo; Intervenções de enfermagem; Boas práticas; Enfermagem oncológica.

ABSTRACT: *The subcutaneous formulations of Trastuzumab (Herceptin®) and Rituximab (MabThera®) are more comfortable for the people affected by cancer who need this type of treatment and are also easier to prescribe, prepare and administer. This type of formulations demands nurses to update their knowledge, so that good practices are assured in the health care setting. With the purpose to support nurses in this matter, the Portuguese Oncology Nursing Association developed two documents with recommendations for administration of subcutaneous Rituximab and Trastuzumab. A group of expert cancer nurses evaluated the applicability of those documents and concluded that they facilitate to standardize procedures and to guide nursing interventions, which might help in the education and follow-up of the people affected by cancer who are under this type of anti-cancer treatments.*

KEYWORDS: *Rituximab, Trastuzumab, Subcutaneous, Nursing interventions, Good practices, Cancer nursing.*